



Rec'd PCT/PTO 29 DEC 2004

# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D 13 OCT 2003

WIPO

PCT

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 22 SEP. 2003

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS  
CONFORMÉMENT À LA  
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE

SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04  
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23  
www.inpi.fr

BEST AVAILABLE COPY

DOCKET NO.: 263864US0X PCT

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

IN RE APPLICATION OF: Alain SANSON, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HERewith

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/FR03/02025

INTERNATIONAL FILING DATE: June 30, 2003

FOR: PEPTIDES WITH AFFINITY FOR A PHOSPHOLIPID AND USES

**REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119**  
**AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Commissioner for Patents  
Alexandria, Virginia 22313


Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

<u>COUNTRY</u>	<u>APPLICATION NO</u>	<u>DAY/MONTH/YEAR</u>
France	02 08202	01 July 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/FR03/02025. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted,  
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,  
MAIER & NEUSTADT, P.C.



Norman F. Oblon  
Attorney of Record  
Registration No. 24,618  
Surinder Sachar  
Registration No. 34,423

Customer Number

**22850**

(703) 413-3000  
Fax No. (703) 413-2220  
(OSMMN 08/03)



26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354\*01

**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 260899

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <b>1 JUIL 2002</b> LIEU <b>75 INPI PARIS</b> N° D'ENREGISTREMENT <b>0208202</b> NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>- 1 JUIL. 2002</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE BREVATOME 3 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) B 14001.3/EE BD 1404 UNIVERSITE PARIS VI			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date ____/____/____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date ____/____/____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date ____/____/____	
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> PEPTIDES AYANT UNE AFFINITE POUR UN PHOSPHOLIPIDE ET UTILISATIONS			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> <b>OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE</b> <b>LA DATE DE DÉPÔT D'UNE</b> <b>DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input checked="" type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	
Prénoms			
Forme juridique		Etablissement public de caractère Scientifique, Technique et Industriel	
N° SIREN		. . . . .	
Code APE-NAF		. . . . .	
Adresse	Rue	31-33 rue de la Fédération	
	Code postal et ville	75752	PARIS 15ème
Pays		FRANCE	
Nationalité		FRANCAISE	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE **1 JUIL 2002**

LIEU **75 INPI PARIS**

N° D'ENREGISTREMENT

**0203202**

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

DS 540 W / 260893

Vos références pour ce dossier :  
(facultatif)

B 14001.3/EE BD 1404 UNIVERSITE PARIS VI

**6 MANDATAIRE**

Nom

**AUDIER**

Prénom

**Philippe**

Cabinet ou Société

**BREVIATOME  
422.5/S002**

N° de pouvoir permanent et/ou  
de lien contractuel

**7068 du 12.06.98**

Adresse

Rue

**3 rue du Docteur Lancereaux**

Code postal et ville

**75008 PARIS**

N° de téléphone (facultatif)

**01.53.83.94.00**

N° de télécopie (facultatif)

**01.45.63.83.33**

Adresse électronique (facultatif)

**brevets.patents@brevaalex.com**

**7 INVENTEUR (S)**

Les inventeurs sont les demandeurs

☐ Oui

☒ Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée

**8 RAPPORT DE RECHERCHE**

Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)

Établissement immédiat  
ou établissement différé

☒

☐

Paiement échelonné de la redevance

Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques

☐ Oui

☐ Non

**9 RÉDUCTION DU TAUX  
DES REDEVANCES**

Uniquement pour les personnes physiques

☐ Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)

☐ Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence):

Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite»,  
indiquez le nombre de pages jointes

**1**

**10 SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE**  
(Nom et qualité du signataire)

**P. AUDIER**

**422-5 S/002**

**VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI**

**REQUÊTE EN DÉLIVRANCE**

Page suite N° 1.../1...

Réservé à l'INPI

REMISE DES PIÈCES

DATE

LIEU

1 JUIL 2002

75 INPI PARIS

N° D'ENREGISTREMENT

0208202

NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 829 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)

B14001.3/EE BD1404/UNIVERSITE PARISVI

☒ **DÉCLARATION DE PRIORITÉ  
OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE  
LA DATE DE DÉPÔT D'UNE  
DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE**

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☒ **DEMANDEUR**

Nom ou dénomination sociale

UNIVERSITE Pierre et Marie CURIE( Paris VI)

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

Adresse

Rue

4 Place Jussieu Tour Centrale

Code postal et ville

75252 PARIS CEDEX 05

Pays

FRANCE

Nationalité

FRANCAISE

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☒ **DEMANDEUR**

Nom ou dénomination sociale

Prénoms

Forme juridique

N° SIREN

Code APE-NAF

Adresse

Rue

Code postal et ville

Pays

Nationalité

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☒ **SIGNATURE DU DEMANDEUR  
OU DU MANDATAIRE  
(Nom et qualité du signataire)**

P. AUDIER 422-5 S/002

**VISA DE LA PRÉFECTURE  
OU DE L'INPI**

PEPTIDES AYANT UNE AFFINITE POUR UN PHOSPHOLIPIDE ET  
UTILISATIONS

DESCRIPTION

5

---

DOMAINE TECHNIQUE

La présente invention se rapporte à une famille de peptides ayant une affinité pour un phospholipide ainsi qu'à diverses utilisations de ce peptide,  
10 notamment dans le domaine pharmaceutique.

De manière générale, les peptides de la présente invention sont utiles pour la reconnaissance spécifique de molécules lipidiques. Ils sont utilisables pour l'ingénierie et la création de composés de  
15 reconnaissance et de séquestration de lipides notamment de lipides chargés négativement, tels que les phosphatidylsérines, les acides phosphatidiques et lyso-phosphatidiques, les phosphatidylglycérols, les cardiolipines et les sphingosines-1-phosphates.

20 Les lipides précités jouent un rôle important notamment dans la signalisation cellulaire et peuvent être présents à la surface externe des membranes des cellules et/ou circuler dans le milieu sanguin à la suite d'événements pathologiques très divers.

25 Divers événements cellulaires aboutissent à l'apparition de lipides chargés négativement et notamment de phosphatidylsérines (PS) à la surface externe des cellules, ces événements peuvent résulter soit d'une altération fortuite ou pathologique de la  
30 cellule, soit d'un événement cellulaire programmé telle que la mort cellulaire ou apoptose. L'apparition de PS à la surface externe des cellules constitue donc un "message primaire" important témoignant de l'existence

d'un dysfonctionnement. Dans le cas du processus de coagulation sanguine, le mécanisme est bien décrit : l'altération des cellules endothéliales des vaisseaux sanguins, soit pour des raisons accidentelles, soit  
5 pour des raisons pathologiques plus complexes, provoque l'apparition de ce message PS à la surface externe des cellules en contact avec le milieu sanguin. Ce message est immédiatement reconnu par certaines protéines circulantes qui déclenchent alors une cascade  
10 d'événements aboutissant au phénomène de coagulation sanguine bien connu.

L'invention tire profit de la propriété des peptides qu'elle fournit de se lier, en présence ou non de calcium, aux lipides et notamment à ceux chargés  
15 négativement, pour la mise au point de composés utilisables comme outils de recherche, de diagnostic et de thérapeutique dans le domaine de la reconnaissance des effecteurs lipidiques et de la détection de l'apoptose, des troubles de la coagulation sanguine, du  
20 choc septique et des pathologies inflammatoires aiguës en particulier.

Concernant la recherche et le diagnostic, les peptides de l'invention peuvent par exemple être couplés à des molécules de détection, par exemple à une  
25 molécule fluorescente, à l'un des partenaires du système avidine-biotine, à un radioélément à vie courte, à un composé paramagnétique, à des particules d'or ou de composés denses pour la microscopie électronique. Avec ces molécules de détection, il est  
30 possible par exemple de détecter des cellules apoptotiques ou de reconnaître des microdomaines membranaires chargés négativement.

Les peptides de la présente invention peuvent donc être utilisés pour une détection "in vitro" de pathologies impliquant l'apparition de charges négatives à la surface des cellules et la libération  
5 dans le sang de microvésicules.

---

Les peptides de la présente invention peuvent également être utilisés pour la détection in vivo et l'imagerie des foyers apoptotiques, de zones thrombotiques, et de manière générale de tout centre  
10 exposant des lipides chargés négativement, lorsque ces peptides sont couplés par exemple à un radioélément à durée de vie courte (les images scintigraphiques, acquises en tomographie d'émission monophotonique (SPECT pour « Single Photon Emission Computed  
15 Tomography ») ou en tomographie par émission de positons (PET pour « Positron Emission Tomography »)) ou à un composé de contraste quelconque tel qu'un complexe de gadolinium pour l'imagerie à résonance magnétique (IRM).

20 Concernant la thérapeutique, de manière générale, les peptides de la présente invention peuvent être utilisés seuls ou couplés à une molécule thérapeutique pour préparer un médicament. Un tel médicament peut par exemple être utilisé pour le ciblage de cette molécule  
25 vers des zones présentant des charges négatives telles que des tumeurs présentant des foyers de cellules apoptotiques ou des tumeurs inflammatoires.

Les peptides de la présente invention peuvent par exemple être couplés à des molécules à action  
30 thrombolytique pour préparer un médicament utilisable dans le traitement et la prophylaxie de la thrombose, ou pour préparer une molécule recouvrant tous les biomatériaux thrombogènes. Les peptides de la présente



invention peuvent donc être utilisés pour le ciblage des molécules thrombolytiques au site du thrombus ou vers les zones thrombogènes.

5 Dans un autre exemple d'application de la présente invention, les peptides de l'invention peuvent être utilisés seuls ou couplés à une molécule anti-inflammatoire pour préparer un médicament, utilisable par exemple dans des pathologies aiguës comme l'asthme, la rectocolite hémorragique (RCH), la maladie de Crohn,  
10 le choc septique, les maladies du collagène et de l'arthrite.

D'autres applications apparaîtront encore à l'homme du métier à la lecture de la description qui suit.

15

#### ETAT DE LA TECHNIQUE

Une famille de protéines, appelées annexines, ont été décrites dans l'art antérieur comme présentant un ancrage fonctionnel réversible à la membrane  
20 cellulaire, régulé par la concentration en calcium et la présence de phospholipides anioniques. Les annexines constituent une famille de protéines exprimées dans des tissus très divers, aussi bien chez les animaux que chez les plantes. Il semble qu'elles ne sont ni  
25 exprimées chez la bactérie, ni chez la levure.

La structure des annexines comporte quatre domaines d'environ 70 acides aminés, ou résidus, très moyennement homologues en séquence mais de topologie quasiment identique.

30

Dans le document WO 92/19279, J. TAIT décrit des conjugués ayant une affinité pour des phospholipides. Il décrit en particulier l'utilisation d'une annexine, en particulier de l'annexine V, pour fabriquer un

conjugué actif utilisable en tant qu'agent thrombolytique.

Malheureusement, le composé décrit dans ce document et préparé à partir de l'annexine entière par  
5 un procédé de recombinaison génétique, possède de nombreux inconvénients qui sont notamment un rendement faible, un coût de fabrication élevé. Les inconvénients majeurs sont surtout l'obtention d'un conjugué fragile du fait de sa topologie complexe conduisant à un  
10 dépliement irréversible. En outre, ces molécules présentent une toxicité majeure pour le rein et le coeur.

Les présents inventeurs ont décrit dans la  
15 demande WO-A-00/20453 une première famille de peptides palliant les inconvénients précités et présentant une affinité pour les phospholipides et une stabilité améliorées.

## 20 EXPOSE DE L'INVENTION

La présente invention a pour but de fournir une nouvelle famille de peptides ayant une affinité pour les lipides, en particulier pour les phospholipides, plus spécifique et encore améliorée par rapport aux  
25 produits de l'art antérieur.

Les peptides de l'invention présentent en outre les avantages d'être plus stables chimiquement que les composés de l'art antérieur et de pouvoir être  
fabriqués de manière reproductible, avec un rendement  
30 élevé et un coût de fabrication très réduit par rapport aux composés de l'art antérieur.

10

15

25

30

les exposants des J, Z, U, X et B représentant la position de ces acides aminés dans ladite séquence.

La séquence peptidique ci-dessus se replie dans l'espace pour adopter sa conformation tertiaire qui est la forme active du peptide.

5 Les acides aminés 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 50, 55, 57, 58, 59, 60 et 65 sont les acides aminés, ou résidus, de la présente invention impliqués directement ou indirectement dans la liaison aux lipides, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués soit dans la  
10 structure tridimensionnelle du peptide pour qu'il adopte sa conformation active permettant de reconnaître un lipide chargé négativement, soit dans le site de reconnaissance du peptide.

Les acides aminés J sont les acides aminés, ou  
15 résidus, de surface de ce peptide lorsqu'il est dans sa conformation repliée et active. Ces résidus sont disposés dans l'espace de telle sorte qu'ils sont partiellement ou totalement exposés au solvant. Selon la présente invention, ces acides aminés J peuvent être  
20 par exemple choisis indépendamment les uns des autres parmi l'ensemble des résidus aminoacides naturels Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Orn, Phe, Pro, Ser, Thr Trp, Tyr et Val, et de telle manière que au moins 50% d'entre eux sont des  
25 résidus polaires choisis parmi Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Lys, Orn, Pro, Ser et Thr. Des exemples sont donnés dans la liste de séquences annexée.

Les acides aminés U sont les résidus de cœur de ce peptide. Dans la conformation repliée et active du  
30 peptide, ils sont disposés dans l'espace proches les uns des autres et non exposés au solvant. Ils constituent le cœur hydrophobe de la protéine. L'assemblage compact des atomes de ces résidus joue un

rôle prédominant pour la stabilité du peptide dans sa conformation active. Ces résidus peuvent être choisis dans la liste d'acides aminés U décrite ci-dessus. Différents exemples de combinaisons de résidus de cœur dans le peptide de séquence (I) de la présente invention sont donnés dans le tableau (1) ci-dessous :

Tableau 1

	U <sup>8</sup>	U <sup>11</sup>	U <sup>15</sup>	U <sup>25</sup>	U <sup>29</sup>	B <sup>37</sup>	U <sup>40</sup>	U <sup>44</sup>	U <sup>52</sup>	U <sup>56</sup>	U <sup>68</sup>	U <sup>72</sup>
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe
Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex = exemple)

10 Le résidu X<sup>18</sup> a pour fonction de maintenir la structure de la boucle Gly-X-Gly dans la forme active du peptide, notamment où les résidus Z<sup>59</sup> et Z<sup>65</sup> sont des Glu, de moduler le caractère hydrophobe et lipophile de

cette boucle, et d'assurer éventuellement des interactions nouvelles spécifiques avec les phospholipides. Ceci est le cas par exemple des résidus Asn, Cys, Ser, Thr, Trp et Tyr.

5 Les résidus Z<sup>59</sup> et Z<sup>65</sup> peuvent être

avantageusement des résidus lysine, ce qui a pour effet de remplacer l'ion calcium par le groupe chargé positivement -NH<sub>3</sub><sup>+</sup> de la lysine et d'améliorer l'affinité du peptide pour une membrane chargée négativement.

10 Le peptide (I) de la présente invention, dans sa forme active comprend trois sites de liaison à un ion calcium où l'ion calcium complexé par ce site constitue un des ligands d'un phospholipide chargé négativement.

15 Le premier de ces sites, appelé site principal, fait intervenir les résidus 15, 18, 19 et 59 en tant que ligands du calcium. Le deuxième de ces sites, appelé site secondaire, fait intervenir les résidus 20 et 22 en tant que ligands du calcium. Le troisième de ces

20 sites, qui est un site secondaire de faible affinité, fait intervenir les résidus 57, 60, et 65 en tant que ligands du calcium.

Les résidus globalement impliqués dans la liaison aux phospholipides sont les résidus 12, 15, 16, 19, 20,

25 22, 50, 55, 57, 58, 59, 60 et 65. Cette liste inclut des résidus impliqués dans les liaisons du calcium, les phospholipides étant des ligands du calcium.

Ces résidus peuvent bien entendu être remplacés par des résidus remplissant la même fonction en vue du

30 même résultat conformément à la présente invention.

A titre d'exemple, selon l'invention, le peptide de formule (I) peut être avantageusement une séquence


peptidique choisie parmi les séquences peptidique ID n°1 à ID n°10 annexées.

La séquence (I) représente les peptides de la présente invention dans leur forme fonctionnelle la plus courte. Il est bien entendu que cette séquence  
5 peut comprendre en outre, liée à l'extrémité N-terminale et/ou à l'extrémité C-terminale de la séquence (I), un ou plusieurs acides aminés, par exemple de 1 à 15 acides aminés, en général de 1 à 10  
10 acides aminés. De toute préférence, ces acides aminés complémentaires ne modifient pas ou peu l'activité des peptides, ou alors l'améliorent.

Par exemple, une petite séquence, appelée ci-dessous séquence de fonctionnalisation peut être utile,  
15 notamment pour fixer un marqueur sur le peptide, pour fixer une molécule de traitement de maladies sur le peptide et/ou pour fixer ledit peptide sur un support. La longueur de cette séquence de fonctionnalisation sera adaptée suivant son usage. Bien entendu, celle-ci  
20 n'interférera de préférence pas avec l'activité du peptide de la présente invention. L'homme du métier saura facilement adapter la longueur et la nature de cette séquence de fonctionnalisation suivant l'utilisation qu'il fera d'un peptide de la présente  
25 invention.

Ainsi, selon un premier mode particulier de réalisation de la présente invention, les peptides de la présente invention peuvent comporter, par exemple à leur extrémité N-terminale, une séquence de  
30 fonctionnalisation de trois acides aminés. Cette séquence de fonctionnalisation permet une fixation directe d'une molécule de traitement de maladies sur le peptide et/ou la fixation directe dudit peptide sur un

support. Les peptides conformes à ce mode de réalisation peuvent être définis par la séquence (II) suivante :



10

dans laquelle J, Z, U, X et B sont tels que définis ci-dessus.

Par exemple, J<sup>-2</sup> peut être Gly, J<sup>-1</sup> peut être Ser, et J<sup>0</sup> peut être Cys, Thr, Pro, Ser, ou Gln. cette  
15 séquence J<sup>-2</sup>J<sup>-1</sup>-J<sup>0</sup> peut être choisie par exemple parmi Gly-Ser-Cys-, Gly-Ser-Thr-, Gly-Ser-Pro-, Gly-Ser-Ser-, Gly-Ser-Gly-, et Gly-Ser-Gln-. Ainsi, par exemple, chacune des séquences IDn°1 à IDn°10 précitée peut comporter au choix chacune des séquences fonctionnelles  
20 précitées. La séquence IDn°12 de la liste de séquences annexée n'est qu'un exemple non limitatif d'une séquences (I) selon la présente invention comportant à son extrémité N-terminale une séquence fonctionnelle de trois acides aminés.

25 Selon un deuxième mode particulier de réalisation de la présente invention, les peptides de séquence (I) peuvent comporter, par exemple à leur extrémité N-terminale, une séquence de fonctionnalisation de quatre acides aminés J<sup>-3</sup>-J<sup>-2</sup>J<sup>-1</sup>-J<sup>0</sup> choisie parmi Gly-Ser-Gly-  
30 Cys-, Gly-Cys-Gly-Ser, Gly-Ser-Gly-Ser, Gly-Cys-Gly-Cys, Gly-Cys-Gly-Ser. Cette séquence de fonctionnalisation est utile par exemple pour une fixation directe d'un marqueur tel que le technétium



sur le peptide. Ce mode de réalisation est exposé ci-dessous. Ainsi, par exemple, chacune des séquences IDn°1 à IDn°10 précitées peut comporter au choix chacune des séquences fonctionnelles précitées. Les  
 5 séquences IDn°11 de la liste de séquences annexée (plusieurs séquences sont regroupées en une seule sous la dénomination IDn°11) ne sont que des exemples non limitatifs de séquences (I) selon la présente invention comportant à son extrémité N-terminale une séquence  
 10 fonctionnelle de quatre acides aminés.

Selon un troisième mode particulier de réalisation de la présente invention, les peptides de séquence (I) peuvent comporter, par exemple à leur  
 15 extrémité N-terminale, une séquence de fonctionnalisation de sept à onze acides aminés. Cette séquence de fonctionnalisation est utile par exemple pour une fixation directe d'un marqueur tel que le technétium sur le peptide. Ce mode de réalisation est exposé ci-dessous. Ainsi, par exemple, chacune des  
 20 séquences IDn°1 à IDn°10 précitées peut comporter au choix chacune des séquences fonctionnelles précitées. On peut aussi remplacer la séquence Gly-Ser-Gly-Cys des séquences IDn°11 à 14 par Gly-Bb1-Gly-Bb2, dans laquelle Bb1 et Bb2 sont indépendamment Cys ou Ser. Les  
 25 séquences IDn°13 et 14 de la liste de séquences annexée (plusieurs séquences sont regroupées en une seule sous la dénomination IDn°13 ou 14) ne sont que des exemples non limitatifs de séquences (I) selon la présente invention.

30

Les peptides de la présente invention ont une affinité suffisante pour le calcium et sont capables de se lier de manière réversible à des effecteurs

lipidiques, et notamment à ceux chargés négativement, tel que les phosphatidylsérines, les acides phosphatidiques, les phosphatidyléthanolamines, les phosphatidylglycérols, les cardiolipines et les phosphatidylinositolphosphates.

Il s'agit d'une famille de peptides dont la propriété principale est de reconnaître spécifiquement l'apparition des signaux lipidiques à la surface des membranes cellulaires en relation avec le fonctionnement normal ou pathologique des tissus.

Les peptides de la présente invention peuvent être synthétisés par les procédés classiques de synthèse de la chimie organique ou de la chimie des protéines, ainsi que par recombinaison génétique *in vivo* ou *in vitro*, par génie génétique, etc.

Aussi, la présente invention se rapporte également à un procédé de fabrication d'un peptide selon l'invention, ledit procédé comprenant une synthèse chimique en phase solide dudit peptide. La synthèse chimique peut être réalisée par exemple avec un synthétiseur automatique de peptide du type Applied Biosystems, mod.433A. Elle peut être réalisée par exemple en chimie Fmoc qui utilise le groupement fluoremylméthyloxycarbonyle pour la protection temporaire de la fonction  $\alpha$ -aminique des acides aminés.

Les éléments techniques pour la réalisation de ce procédé de synthèse peptidique sont connus de l'homme du métier. Ils sont décrits par exemple dans l'ouvrage Solid-Phase Organic Synthesis de Kevin Burgess (Editor) Wiley-Interscience; ISBN: 0471318256; (February 2000).

Le peptide de l'invention peut aussi être

fabriqué par recombinaison génétique *in vivo* par exemple au moyen d'un procédé comprenant les étapes suivantes :

- 5 a) préparation d'un cDNA comprenant une séquence de base codant pour ledit peptide
- b) insertion dudit cDNA dans un vecteur d'expression approprié,
- c) transformation d'une cellule hôte appropriée, avec ledit vecteur dans lequel le cDNA a été
- 10 inséré, pour une réplication du plasmide,
- d) fabrication dudit peptide par traduction dudit cDNA dans ladite cellule hôte, et
- e) récupération du peptide synthétisé.

15 Selon l'invention, le vecteur d'expression approprié et la cellule hôte sont choisis selon les techniques habituelles pour la recombinaison génétique. Le vecteur peut être l'un quelconque des plasmides généralement utilisés dans cette technique, par exemple

20 un plasmide tel que le vecteur pGEX-2T. De même la cellule peut être choisie selon les techniques habituelles, il peut s'agir par exemple de *E. Coli*.

Lorsqu'une technique de recombinaison génétique *in vitro* est utilisée, les étapes c) et d) du procédé

25 ci-dessus sont remplacées respectivement par les étapes c') d'introduction du vecteur dans lequel le cDNA a été inséré dans un milieu réactionnel adéquat pour une réplication du plasmide, et d') de fabrication dudit peptide par traduction dudit cDNA dans ledit milieu

30 réactionnel adéquat. Le document Jagus, R. and Beckler, G.S. (1998) Overview of eukaryotic *in vitro* translation and expression systems, *Current Protocols in Cell Biology* 11.1.1-11.1.13., 1998 by John Wiley & Sons,

Inc. décrit des procédés *in vitro* utilisables dans la présente invention.

La présente invention fournit également un  
5 ~~assemblage chimique ayant une affinité pour un~~  
phospholipide, comprenant au moins deux peptides de la  
présente invention, identiques ou différents, lesdits  
peptides étant liés entre eux. Ces assemblages peuvent  
être réalisés par exemple par insertion d'un lien  
10 peptidique flexible, par exemple poly-glycine, entre le  
résidu C-terminal d'un peptide de l'invention et le  
résidu N-terminal du second peptide et ainsi de suite  
selon le nombre de peptides mis bout à bout. Ce lien  
poly-glycine peut être de formule  $-(Gly)_n-$ ,  $n$  étant un  
15 nombre entier allant de 1 à 12, par exemple supérieur à  
4.

Ces assemblages peuvent également être  
synthétisés par les procédés classiques de synthèse de  
la chimie organique ou de la chimie des protéines,  
20 ainsi que par recombinaison génétique *in vivo* ou *in*  
*vitro*, par génie génétique, etc., par exemple par un  
des procédés précités.

Ces assemblages ont notamment pour but  
d'augmenter l'affinité des peptides de la présente  
25 invention pour le phospholipide, par exemple pour un  
phospholipide chargé négativement.

L'utilisation d'un assemblage de la présente  
invention peut se faire dans trois directions : la  
30 thérapeutique, la recherche et le diagnostic, et les  
applications sont très nombreuses.

Les pathologies spécialement visées par la  
présente invention sont : (i) les troubles de la

Inc. décrit des procédés *in vitro* utilisables dans la présente invention.

La présente invention fournit également un  
5 assemblage chimique ayant une affinité pour un phospholipide, comprenant au moins deux peptides de la présente invention, identiques ou différents, lesdits peptides étant liés entre eux. Ces assemblages peuvent être réalisés par exemple par insertion d'un lien  
10 peptidique flexible, par exemple poly-glycine, entre le résidu C-terminal d'un peptide de l'invention et le résidu N-terminal du second peptide et ainsi de suite selon le nombre de peptides mis bout à bout. Ce lien poly-glycine peut être de formule  $-(\text{Gly})_n-$ ,  $n$  étant un  
15 nombre entier allant de 1 à 12, par exemple supérieur à 4. Selon l'invention, au moins un des peptides de l'assemblage peut être un peptide comportant une séquence choisie parmi les séquences ID n°1 à 10 de la liste de séquences annexées.

20 Ces assemblages peuvent également être synthétisés par les procédés classiques de synthèse de la chimie organique ou de la chimie des protéines, ainsi que par recombinaison génétique *in vivo* ou *in vitro*, par génie génétique, etc., par exemple par un  
25 des procédés précités.

Ces assemblages ont notamment pour but d'augmenter l'affinité des peptides de la présente invention pour le phospholipide, par exemple pour un phospholipide chargé négativement.

30 L'utilisation d'un assemblage de la présente invention peut se faire dans trois directions : la thérapeutique, la recherche et le diagnostic, et les applications sont très nombreuses.

Les pathologies spécialement visées par  
35 la présente invention sont : (i) les troubles de la

coagulation sanguine, (ii) les phénomènes d'apoptose consécutifs à l'action de composés chimiques, d'effets physiques comme les radiations ionisantes, d'effets biologiques comme ceux liés à la formation ou la

5 nécrose des tissus cancéreux, outre les phénomènes

---

normaux d'apoptose, (iii) les pathologies inflammatoires, et (iv) les troubles associés aux relations entre les cellules et la matrice extracellulaire et notamment le collagène.

10 Les peptides de la présente invention présentent en outre un avantage important par rapport aux composés de l'art antérieur : la réversibilité de leurs processus de repliement qui permet leur manipulation à des températures élevées mais compatibles avec la

15 stabilité chimique des peptides, à des fins de modifications chimiques dans le but de développer des molécules utilisables en imagerie et en thérapeutique.

En outre, en raison de leur faible taille, les peptides de la présente invention peuvent être

20 facilement associés à d'autres protéines soit pour former des protéines chimères multifonctionnelles, soit pour introduire un mécanisme de régulation par des effecteurs autres que les phospholipides de signalisation.

25 Les peptides de la présente invention peuvent être utilisés en tant que tels pour fabriquer un médicament utilisable pour un traitement ou pour une prophylaxie car ils possèdent des propriétés anticoagulante et anti-inflammatoire intrinsèques. Ils

30 permettent d'effectuer un tapissage des surfaces cellulaires, capable d'interdire l'accès de composés impliqués dans les étapes primaires de la coagulation

sanguine et les phénomènes inflammatoires à ces surfaces.

Ainsi, selon l'invention, les peptides ou assemblages de la présente invention peuvent être  
5 utilisés en tant que tels pour préparer un médicament, par exemple choisi parmi un médicament destiné au traitement d'une thrombose, un médicament destiné au traitement d'une tumeur, un médicament ayant une action anti-inflammatoire.

10 Les peptides de la présente invention peuvent également être utilisés couplés à des molécules de traitement pour le ciblage de ces molécules vers des zones présentant des charges négatives telles qu'à un site du thrombus, d'une inflammation ou vers une zone  
15 tumorale. Dans cette application, les peptides et assemblages de la présente invention sont par exemple couplés respectivement à une molécule qui a une action thrombolytique, à une molécule qui a une action anti-inflammatoire ou à une molécule qui a une action anti-  
20 tumorale. Des exemples de molécules ayant une activité thrombolytique utilisables selon la présente invention sont les streptokinases, les urokinases, et les activateurs du plasminogène. D'une façon générale les peptides et assemblages de la présente invention  
25 peuvent être couplés indifféremment à des composés pro-apoptotiques anti-apoptotiques et anti-inflammatoires.

Les peptides et assemblages de la présente invention peuvent donc être utilisés couplés à une molécule ayant une activité thrombolytiques pour  
30 fabriquer un médicament utilisable dans le traitement et la prophylaxie de la thrombose ; couplés à une molécule ayant une action anti-inflammatoire pour fabriquer un médicament utilisable par exemple par voie

locale ou par voie intraveineuse pour traiter des pathologies aiguës comme l'asthme, la RCH, la maladie de Crohn, le choc septique, les maladies du collagène et l'arthrite ; ou couplés à une molécule ayant une action antitumorale pour fabriquer un médicament utilisable pour traiter des tumeurs.

Pour une utilisation dans la recherche ou le diagnostique, les peptides de la présente invention peuvent être couplés à une molécule de marquage permettant sa détection. Cette molécule de marquage peut être par exemple une molécule fluorescente, des particules d'or ou de composés denses, de type nanoparticules, pour la microscopie électronique, un radioélément, un composé paramagnétique et de manière générale, une des molécules de marquage couramment utilisées dans les laboratoires. Pour faciliter certains marquages ou liaisons, cette molécule pourra être liée à l'un des partenaires du système avidine-biotine.

Selon l'invention, les peptides et les assemblages chimiques selon l'invention peuvent être couplés à une molécule de marquage pour former un composé de marquage utilisable par exemple pour un diagnostique *in vivo* ou *in vitro*.

En effet, les peptides de la présente invention peuvent être utilisés pour la détection de pathologies impliquant l'apparition de charges négatives à la surface des cellules et la libération dans le sang de microvésicules : par exemple les troubles de la coagulation, les pathologies inflammatoires aiguës, etc. et l'apoptose.



Ils peuvent, par exemple, être couplés à des radioéléments à vie courte tels que le technétium ou le fluor 18 et permettre une détection "in vivo" de la localisation des zones thrombotiques lors d'accidents vasculaires de toutes sortes, en particulier des foyers apoptotiques et inflammatoires, en utilisant des systèmes d'imagerie.

Les peptides de la présente invention peuvent aussi, par exemple, être couplés à des composés paramagnétiques, tel qu'un complexe de gadolinium, à tout agent de contraste utilisable en imagerie par résonance magnétique (IRM) tel que par exemple un composé paramagnétique ou un composé ferromagnétique, ou à tout élément radioactif à durée de vie courte. Ils peuvent ainsi permettre une détection "in vivo" de la localisation des zones thrombotiques, des zones apoptotiques et inflammatoires.

Les couplages précités peuvent être réalisés par toutes les techniques classiques de chimie organique connues de l'homme du métier.

Par exemple dans le cas du technétium, ce dernier peut être couplé directement au peptide de la présente invention, par exemple lorsque le peptide de séquence (I) comporte une séquence de fonctionnalisation telles que celles décrites ci-dessus. Ce type de couplage est décrit par exemple dans le document US 6 323 313 de J. F. Tait et al. L'homme du métier comprendra que des marqueurs équivalents au technétium pourront également être couplés de cette manière directement au peptides de la présente invention.

Le technétium, ou tout autre métal tels que ceux cités dans la présente, peut aussi être couplé indirectement au peptide de la présente invention. Ce

couplage est réalisé par exemple au moyen d'une cage complexant ledit métal. Cette cage peut être fixée au peptides de la présente invention au moyen d'une séquence de fonctionnalisation telles que celles

---

5 ~~décrites ci-dessus. Dans l'exemple du technétium, des~~  
cages à technétium utilisables selon la présente invention sont décrites par exemple dans le document 99mTc Labeling of Highly Potent Small Peptides Shuang Liu, D. Scott Edwards, and John A. Barrett,

10 *Bioconjugate Chem.* 1997, 8, 621-636.

Les peptides ou assemblages couplés ou prêts à être couplés, suivant l'application désirée, peuvent être avantageusement conditionnés sous la forme de

15 trousse de diagnostic. Ainsi, la présente invention fournit également une trousse de diagnostic comprenant un peptide ou un assemblage conformes à la présente invention. Cette trousse de diagnostic peut par exemple comprendre en outre un réactif adéquat permettant de

20 détecter ladite molécule de marquage.

La présente invention fournit également une trousse d'analyse et de détection de charges négatives à la surface de cellules, caractérisée en ce qu'elle comprend un peptide ou un assemblage chimique de la

25 présente invention.

La présente invention fournit également une trousse d'analyse et de détection de microvésicules dans le sang, caractérisée en ce qu'elle comprend un peptide ou un assemblage chimique conformes à la

30 présente invention couplé à un marqueur.

Dans une autre application de la présente invention, des peptides ou des assemblages de

couplage est réalisé par exemple au moyen d'une cage complexant ledit métal. Cette cage peut être fixée au peptides de la présente invention au moyen d'une séquence de fonctionnalisation telles que celles  
5 décrites ci-dessus. Dans l'exemple du technétium, des cages à technétium utilisables selon la présente invention sont décrites par exemple dans le document 99mTc Labeling of Highly Potent Small Peptides Shuang Liu, D. Scott Edwards, and John A. Barrett,  
10 *Bioconjugate Chem.* 1997, **8**, 621-636.

Les peptides ou assemblages couplés ou prêts à être couplés, suivant l'application désirée, peuvent être avantageusement conditionnés sous la forme de  
15 trousse de diagnostic. Ainsi, la présente invention fournit également une trousse de diagnostic comprenant un peptide ou un assemblage conformes à la présente invention. Cette trousse de diagnostic peut par exemple comprendre en outre un réactif adéquat permettant de  
20 détecter ladite molécule de marquage.

La présente invention fournit également une trousse d'analyse et de détection de charges négatives à la surface de cellules, caractérisée en ce qu'elle comprend un peptide ou un assemblage chimique de la  
25 présente invention, le peptide ou l'assemblage pouvant être couplé à un marqueur.

La présente invention fournit également une trousse d'analyse et de détection de microvésicules dans le sang, caractérisée en ce qu'elle comprend un  
30 peptide ou un assemblage chimique conformes à la présente invention, le peptide ou l'assemblage pouvant être couplé à un marqueur.

Dans une autre application de la présente invention, des peptides ou des assemblages de

l'invention peuvent être utilisés, par exemple, pour le recouvrement d'un matériau biocompatible. Ce type de matériau est utilisable dans deux sortes de conditions : i) les circulations extracorporelles, et  
5 ii) la conservation du sang.

---

Ainsi, les peptides de la présente invention trouvent une application par exemple pour la fabrication d'un filtre pour le piégeage et la récupération, dans la circulation sanguine extra  
10 corporelle de cellules circulantes activées : plaquettes, globules rouges, leucocytes... Le sang réintroduit chez le patient sera ainsi débarrassé des cellules susceptibles de créer des coagulations anormales, des réactions fébriles etc.... Ce filtre peut  
15 se présenter sous la forme d'un film plissé de polymère biocompatible sur lequel peuvent être greffé par tout moyen approprié les peptides de la présente invention. Ces mêmes filtres peuvent être introduits dans les poches servant à la conservation du sang ou tapisser  
20 l'intérieur de celles-ci. Ces filtres constituent des "éponges" capable de capter en continu les cellules sanguines contenues dans la poche qui sont activées en particulier à la suite de leur vieillissement et de leur engagement dans le processus d'apoptose.

25 Les différents marquages, couplages et fixation exposés ci-dessus, se feront de toute préférence en préservant l'activité du peptide de la présente invention, en général aux extrémités ou au niveau des extrémités du peptide de la présente invention ou sur  
30 des résidus de surface.

D'autres avantages et caractéristiques de la présente invention apparaîtront encore à la lecture des

exemples illustratifs et non limitatifs qui suivent, en référence aux figures en annexe.

#### BREVE DESCRIPTION DE LA LISTE DE SEQUENCES

- 5           - Les séquences IDn°1 à IDn°14 annexées sont des exemples de peptides comportant la séquence peptidique (I) et (II) de la présente invention.

En, particulier, les séquences IDn°11, IDn° 13 et IDn°14 sont des exemples de peptides comportant la  
10 séquence peptidique de la présente invention dans lesquels des mutations ont été introduites pour augmenter l'affinité pour le calcium et les phospholipides.

#### 15   BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

- Les figures 1 et 2 sont des micrographies obtenues à partir de coupes de tissus respectivement d'un cœur apoptotique (figure 1) et d'un rein (figure 2). Ces coupes ont été obtenues d'une part (clichés de  
20 gauche) avec des peptides AFIM-fluorescéine (AFIM-F) de la présente invention, d'autre part (clichés de droite) avec de l'annexine 5 -fluorescéine (A5-F) (composé de l'art antérieur) : microscopie de fluorescence, grossissement x 40. Les clichés du centre ont été  
25 obtenus avec de l'hématoxyline : microscope en lumière visible, grossissement x 40. Sur la figure 1, les photos du haut et du bas représentent différentes coupes du cœur.

- La figure 3 est un graphique qui représente  
30 le taux d'hélicité « H » (en %) d'un peptide selon la présente invention en fonction de la température « t » en °C.

EXEMPLES

Exemple 1 : Synthèse par recombinaison génétique :  
Expression et purification des peptides de séquences ID

5 n°1 à ID n°12 de la présente invention

Les séquences ID n°1 à ID n°14 ont été préparées par surexpression dans *E. Coli* selon le même protocole que celui qui a été décrit par F. Cordier-Ochsenbein et al. dans J. Mol. Biol. 279, 1177-1185.

10 Les cDNA de chacune de ces séquences ont été préparés en utilisant une réaction de polymérase en chaîne (PCR). Ils ont été insérés dans le vecteur pGEX-2T (Smith & Jonhson, 1998). La figure 2 est un schéma illustrant l'insertion du cDNA dans le vecteur.  
15 L'absence de mutations induites par la PCR a été contrôlée par séquençage.

La production des peptides est effectuée en utilisant la souche *E. Coli* BL21 contenant le vecteur d'expression décrit plus haut. Après induction par  
20 l'isopropylthiogalactopyranoside (IPTG, 100 µm) jusqu'à une densité optique de 1 à 600 nm, la pousse est continuée jusqu'à ce qu'un plateau soit atteint, c'est-à-dire pendant environ 3 heures. Après centrifugation, les bactéries sont re-suspendues dans le tampon de lyse  
25 comprenant 50 mM Tris-HCl, pH 8, 10 mM EDTA, 500 mM NaCl, 5% (v/v) glycérol, 1% (v/v) Triton X100, 1 mM dithiothréitol (DTT), 1 mM fluorure de phénylméthylsulfonyl (PMSF) et 20 µg/ml d'aprotinine.

La purification a été effectuée de la façon  
30 suivante : après sonication et centrifugation à 10000 g, le surnageant contenant les protéines solubles est incubé avec des billes de glutathion/agarose permettant la liaison spécifique à ces billes de la

protéine de fusion GST-domaine. Après lavage avec une solution contenant 1 M NaCl, 50 mM Tris-HCl à pH 8, 70 unités de thrombine par litre de culture sont ajoutés et les séquences sont éluées.

5 Les séquences sont alors purifiées sur une colonne proRPC (marque de commerce) de type 16/10, fournie par la société Pharmacia en utilisant un système FPLC et un gradient linéaire d'eau de qualité Millipore (marque de commerce) contenant 0,1% (v/v)  
10 d'acide trifluoroacétique TFA, et d'acétonitrile contenant 0,1% de TFA. La vitesse d'écoulement est ajustée à 2,5 ml/minute. Les séquences sont ensuite lyophilisées.

15 Le rendement final pour chaque peptide est d'environ 8 mg de séquence par litre de culture.

**Exemple 2 : Exemple de synthèse chimique de peptides de la présente invention**

20 Les peptides de la présente invention ont été fabriqués dans cet exemple par synthèse chimique en phase solide avec un synthétiseur automatique de peptides Applied Biosystems, mod. 433A, et en chimie Fmoc, qui utilise le groupement Fluorénylméthoxyloxycarbonyl (Fmoc) pour la protection  
25 temporaire de la fonction  $\alpha$ -aminique des acides aminés.

Les groupements protecteurs utilisés pour prévenir les réactions secondaires des chaînes latérales des acides aminés, dans cette stratégie Fmoc, ont été le tertio-butyle éther (tBu) pour les résidus  
30 Ser, Thr et Tyr ; tertio-butyle ester (OtBu) pour Asp, Glu ; trityle (Trt) pour Gln, Asn, Cys, His ; tertio-butyloxycarbonyl (Boc) pour Lys et

2,2,5,7,8-pentaméthylchromane-6-sulfonyle (Pmc) pour Arg.

La réaction de couplage se déroule avec un excès de 10 équivalents d'acides aminés (1 mmol) par rapport à la résine (0,1mmol). L'acide aminé protégé est dissous dans 1 ml de N-méthylpyrrolidone (NMP) et 1 ml d'une solution de 1-N-hydroxy-7-azabenzotriazole (HOAt) 1M dans le solvant NMP. 1 ml d'une solution de N,N'-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) 1M est alors ajouté. Après 40 à 50 minutes d'activation, l'ester actif formé est transféré dans le réacteur qui contient la résine. Avant cette étape de transfert puis de couplage, la résine est déprotégée de son groupement Fmoc par une solution de 20 % de pipéridine dans le NMP. L'excès de pipéridine est enlevé par lavage à la NMP après 5 à 10 minutes environ.

Pendant la déprotection, la détection des adduits dibenzofulvène-pipéridine à 305 nm permet de suivre le bon déroulement de la synthèse. En effet, la quantification de l'adduit permet d'estimer l'efficacité de la déprotection du groupement Fmoc et par suite du couplage du dernier acide aminé incorporé.

Le clivage de la résine et des groupements protecteurs présents sur les chaînes latérales a été réalisé simultanément par traitement du peptide lié à la résine par de l'acide trifluoroacétique (TFA). Avant d'effectuer le clivage, la résine a été lavée plusieurs fois au dichlorométhane (DCM) et enfin séchée. Le réactif utilisé lors du clivage est un mélange acide contenant 81,5 % de TFA et les piègeurs phénol (5 %), eau (5 %), éthanedithiol (2,5% lorsque le peptide comporte une cystéine) et tri-isopropylsilane (1 %). La résine a été traitée avec ce mélange pendant trois



heures sous agitation et à température ambiante, à raison de 100 ml de solution par gramme de résine. Le peptide libre en solution a été récupéré par filtration. Le peptide a été ensuite précipité et lavée à froid dans l'éther de diisopropyle puis dissous dans de l'acide acétique à 20 % et lyophilisée.

Le peptide récupéré après lyophilisation, le brut de synthèse, se trouve sous forme réduite, c'est à dire que les ponts disulfures inter-chaînes ne sont pas formés.

Le peptide est alors purifié sur une colonne proRPC (marque de commerce) de type 16/10, fournie par la société Pharmacia en utilisant un système FPLC et un gradient linéaire d'eau de qualité Millipore (marque de commerce) contenant 0,1% en volume d'acide trifluoroacétique TFA, et d'acétonitrile contenant 0,1% de TFA. La vitesse d'écoulement est ajustée à 2,5 ml/minute. Le peptide est ensuite lyophilisé.

Les produits obtenus ont été analysés par spectrométrie de masse.

### Exemple 3 : Stabilité des séquences ID n°1 à IDn°14

Cet exemple montre que les peptides de la présente invention constituent des protéines de repliement stables.

#### Composition du blanc (témoin) :

Tris 50 mM, NaCl 150 mM, DTT 1 mM pH8 10 µL

H<sub>2</sub>O 990 µL

Ajusté à pH8

#### Composition de l'échantillon :

Echantillon : domaine purifié dans tampon Tris 50 mM, NaCl 150 mM, pH8 Concentration aprox. : 200 mg.ml.

Domaine : 10 µL soit 300 µM final.

H<sub>2</sub>O : 990 µL.

pH mesuré à 7,8.

Configuration matérielle et logicielle :

Appareil Jobin Yvon CD6.

5 Logiciel CD-max

Trajet optique de la cuvette de mesure : 1 cm.

La figure 1 annexée représente le taux d'hélicité de AFIM en fonction de la température tel qu'il est mesuré à l'aide du signal de dichroïsme circulaire dans  
10 l'UV lointain à la longueur d'onde de 220 nm.

Sur cette figure, la valeur du signal à 14°C est prise pour le 100% du contenu en hélice du peptide. La dénaturation thermique du peptide est bien coopérative et démontre qu'à basse température et notamment à 37°C  
15 il s'agit d'un peptide convenablement replié et présentant une stabilité améliorée.

Exemple 4 : Assemblages de deux peptides de la présente invention

20 Le procédé décrit dans l'exemple 1 ci-dessus est utilisé pour synthétiser une séquence peptidique de séquence IDn°1-(gly)<sub>4</sub>-IDn°1.

Le rendement final pour l'assemblage est d'environ 14 mg/litre de culture.

25

Exemple 5 : Marquage d'un peptide de la présente invention par la fluorescéine

Dans les exemples qui suivent, le peptide de la présente invention est appelé AFIM-SH. Il a une  
30 séquence peptidique telle que définie par la séquence (I). Les séquences IDn°1 à IDn°14 sont testées.

La fluorescéine est une molécule qui émet une


fluorescence verte d'une longueur d'onde de 525 nm lorsqu'elle est excitée à une longueur d'onde de 488 nm. L'émission de lumière verte est détectée par des caméras ou des photomultiplicateurs. Ce couplage  
 5 d'AFIM à la fluorescéine permet de détecter la présence des cellules présentant la PS aussi bien *in vitro* que *in vivo* chez des petits animaux.

Selon la présente invention, il est possible de marquer AFIM au niveau des résidus de surface sur toute  
 10 cystéine qui serait introduite à la place de n'importe quel acide aminé présent à la surface d'AFIM (résidus de surface) pour autant que la fonction de liaison aux membranes lipidiques ne soit pas perturbée. AFIM ainsi modifié est désigné AFIM-SH ci-dessous.

15 Le couplage de la fluorescéine se fait par l'intermédiaire d'une fonction maléimide représentée ci-dessous sur AFIM par la fonction SH.

La fluorescéine est couplée à une ou plusieurs cystéine(s) de la séquence, de manière covalente, en  
 20 utilisant une fonction maléimide.

Schéma général du marquage (schéma I) :



25

Tout le marquage se fait à une température inférieure à 20°C.

AFIM-SH est en solution dans du tampon Tris

(50 mM), NaCl (150 mM), pH = 7.4. 5 équivalents de DTT en solution dans le même tampon sont additionnés à la solution de AFIM-SH. Le milieu est agité durant 30 min.

A l'abri de la lumière: la fluorescéine (5  
5 équivalents d'AFIM-SH + 2 équivalents de DTT) est pesée  
et dissoute dans du DMF, et additionnée à la solution  
précédente. Le tout est agité, et la réaction est  
poursuivie 30 min. Puis le milieu est dilué dans 150 ml  
de tampon PBS (Phosphate 20 mM, NaCl 150 mM), pH = 7.4,  
10 et ultra-filtré sur membrane YM3 (marque de commerce).  
L'échantillon est re-dilué et ultra-filtré plusieurs  
fois, en faisant le spectre UV du filtrat.

Lorsqu'il n'y a plus de fluorescéine dans le  
filtrat (pic à 490 nm), l'échantillon est concentré à  
15 quelques ml et conservé au frais à 4°C.

Les produits AFIM-Fluorescéine ont été employés  
pour détecter des cellules apoptotiques en cytométrie  
de flux *in vitro*, ainsi que chez des animaux *in vivo* de  
20 la manière décrite dans l'exemple 6 suivant.

Exemple 6 : Résultats de marquages de cellules  
apoptotiques par les produits AFIM-Fluorescéine  
Imagerie de cellules cardiaques apoptotiques après un  
25 infarctus chez le rat.

Un modèle d'apoptose chez le rat est utilisé  
comme il est décrit dans l'article paru dans  
*Circulation Res.* 1996, 79, 946-956.

Brièvement, quatre rats (300 g chacun) ont été  
30 anesthésiés, intubés et ventilés. L'ischémie du  
myocarde fut provoquée par une occlusion temporaire de  
l'artère coronaire. Après 30 minutes d'occlusion,  
l'artère coronaire fut re-perfusée pendant une heure.

A la fin de la période de re-perfusion, les peptides AFIM-Fluorescéine de l'exemple 5 ont été injectés dans la veine jugulaire à raison de 200 µg de peptide pour chacun de deux des rats dans un volume total de 1 ml.

A titre comparatif, 200µg d'annexine 5-Fluorescéine (composés de l'art antérieur) ont été injectés dans les mêmes conditions pour chacun des deux autres rats dans un volume total de 1 ml.

10 Les rats ont été sacrifiés après 60 minutes.

Cinq organes ont été conservés pour cette étude: le cœur, le poumon, le rein, le foie et le cerveau. Il ont été lavés et rincé en présence de formol. Les organes ont ensuite été déshydratés et imprégnés de paraffine pendant environ 12 heures puis des coupes de 7 µm furent effectuées.

Quelques coupes furent colorées à l'hématoxyline. Les coupes ont été examinées au microscope à fluorescence et les coupes adjacentes colorées à l'hématoxyline furent examinées avec un microscope en lumière visible. Les coupes colorées à l'hématoxyline (marquées H1 et H2 respectivement sur les figures 1 et 2 annexées) permettent une visualisation de l'architecture des tissus et la microscopie de fluorescence de détecter le marquage par AFIM-Fluorescéine (AFIM-F) ou par l'annexine 5-Fluorescéine (A5-F).

La figure 1 annexée montre les images obtenues pour le cœur apoptotique et la figure 2 annexée montre les images obtenues pour le rein.

La figure 1 montre clairement l'excès de fluorescence correspondant à l'accumulation de marqueur au niveau des cellules apoptotiques. Le contraste est

visiblement bien meilleur avec AFIM de la présente invention qu'avec l'annexine 5 de l'art antérieur.

La figure 2 montre le marquage du rein lié à l'élimination partielle des produits. Dans le cas de AFIM les glomérules ne semble pas marqués, seule les tubules proximaux sont partiellement marqués. Par contre dans le cas de l'annexine 5 de l'art antérieur l'ensemble du tissu rénal est fortement marqué, ce qui est en accord avec la toxicité rénale observée pour cette protéine.

Les résultats obtenus dans cet exemple démontrent une grande spécificité des peptides de la présente invention pour le marquage des cellules.

Le marquage du peptide AFIM, par exemple de IDn°1 à 10, par la fluorescéine permet donc de détecter efficacement la phosphatidylsérine (PS) présente à la surface externe des cellules impliquées dans des processus physiopathologiques comme la mort cellulaire programmée (apoptose) la coagulation du sang, la réaction inflammatoire.

Exemple 7 : Marquage d'un peptide de la présente invention par le technétium  $^{99m}\text{Tc}$

Le marquage d'AFIM par le  $^{99m}\text{Tc}$  permet, comme pour la fluorescéine, de détecter la phosphatidylsérine (PS) présente à la surface externe des cellules impliquées dans des processus physiopathologiques comme la mort cellulaire programmée (apoptose), la coagulation du sang, la réaction inflammatoire. Le  $^{99m}\text{Tc}$  est un émetteur de rayons  $\gamma$  qui permet une détection d'AFIM dans toute zone du corps par différents types de caméras détectant les rayonnements  $\gamma$ . Ce couplage

d'AFIM au  $^{99m}\text{Tc}$  permet de détecter la présence des cellules présentant la PS *in vivo* chez tout être vivant.

Deux types de marquage au technétium sont exposés dans cet exemple : un marquage indirect (A) et un marquage direct (B).

#### A) MARQUAGE INDIRECT

Dans cet exemple, AFIM-SH est couplé, au niveau d'une cystéine de sa séquence, à une molécule complexante appelée molécule cage, capable de recevoir de manière spécifique l'ion  $^{99m}\text{Tc}$ . La réaction de couplage est schématisée ci-dessous (schéma II).

La molécule cage choisie est le  $\text{NH}_2\text{-C}_3(\text{Bham})_2$  (2) décrit dans le document suivant: Bis(Hydroxamamide)-Based Bifunctional Chelating Agent for  $^{99m}\text{Tc}$  Labelling of Polypeptides, Le-Cun Xu et al. *Bioconjugate Chem.* 1999, 10, 9-17. Cette cage est couplée au dérivé maléimide (1) selon le schéma (II) pour donner le marqueur (3) qui est ensuite couplé à AFIM-SH pour donner le composé nommé AFIM-cage (Schéma (II)). Le couplage est effectué de la façon suivante:

AFIM-SH est en solution dans du tampon Tris (50 mM), NaCl (150 mM), pH = 7.4. 5 équivalents d'hydrochlorure de tris-(2-carboxyéthyl)-phosphine (TCEP) sont pesés, dissous dans le même tampon et additionnés à AFIM-SH. Le milieu est agité et laissé à température ambiante durant 30 minutes.

Pendant ce temps, 10 équivalents de (1) sont mis en solution dans du diméthylformamide (DMF) et transférés sur 20 équivalents de cage (2) dans le même volume de DMF. Après 10 min de réaction, le produit est ajouté à AFIM-SH.

Le tout est agité, et la réaction est poursuivie 30 min à température ambiante. Puis le milieu est dissous dans 150 ml de tampon Tris (50 mM), NaCl (150 ml), pH = 7.4, et ultra-filtré sur membrane YM3 (marque de commerce). L'échantillon est re-dilué et ultra-filtré plusieurs fois, en faisant le spectre UV du filtrat. Lorsqu'il n'y a plus de DMF dans le filtrat (pic à 214 nm), l'échantillon est concentré à quelques ml et conservé au frais (4°C).

10




Schéma (II)



Une quantité adaptée à la taille de l'animal, du peptide couplé à la cage à technétium (AFIM-cage) préparé dans cet exemple, est prélevée et une solution aqueuse de  $\text{SnCl}_2$  (6 équivalents par rapport au peptide) est ajoutée. La solution de  $^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$  est ajoutée et la réaction est poursuivie 30 minutes à température ambiante.

La solution de peptide marqué (AFIM-cage- $^{99\text{m}}\text{Tc}$ ) est ensuite directement injectée par voie intraveineuse à l'animal.

Les images sont alors recueillies au moyen d'une caméra capable de détecter des rayons  $\gamma$  (SPECT ou autre caméra).

#### B) MARQUAGE DIRECT

Dans cet exemple, AFIM est marqué au technétium sans cage. Pour cela, AFIM est doté d'une séquence de fonctionnalisation de quatre acides aminés qui fixent directement le technétium.

La séquence peptidique IDn°11 est utilisée dans cet exemple. La séquence de fonctionnalisation est Gly-Ser-Gly-Cys du côté N-terminal, les résidus 5 à 79 de la séquence IDn°11 étant ceux formant le séquence (I) de la présente invention.

Pour le marquage, le peptide de séquence IDn°11 et 5 équivalents de TCEP sont mis en solutions dans du sérum physiologique et équilibrés pendant 15 mn. On ajoute ensuite 10 équivalents de  $\text{SnCl}_2$ . Cette solution peut être lyophilisée et conservée sous azote.

Le marquage est effectué en ajoutant une solution de  $^{99\text{m}}\text{TcO}_4^-$ . Après une incubation de 15 minutes, la solution est passée sur une colonne PD10 (marque de

commerce).

La séquence IDn°11 marquée directement au technétium (AFIM-<sup>99m</sup>Tc) est injectée par voie intraveineuse.

5 Les images sont alors recueillies avec une caméra  
telle que celle utilisée ci-dessus.

---

Exemple 8 : Marquage d'un peptide de la présente invention avec du gadolinium

10 AFIM couplé au gadolinium : AFIM-cage-Gd (marquage indirect).

Le marquage d'AFIM par le gadolinium permet, comme pour les précédents marqueurs, de détecter la phosphatidylsérine (PS) présente à la surface externe  
15 des cellules impliquées dans des processus physiopathologiques comme la mort cellulaire programmée (apoptose), la coagulation du sang, la réaction inflammatoire. Le gadolinium est un agent paramagnétique qui permet une détection d'AFIM dans  
20 toute zone du corps par des procédés d'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Ce couplage d'AFIM au gadolinium permet de détecter avec une résolution pouvant aller jusqu'au mm la présence des cellules présentant la PS *in vivo* chez tout être vivant.

25 Comme pour la fluorescéine, AFIM peut être couplée, au niveau d'une cystéine, à une molécule chimique capable de recevoir de manière spécifique l'ion gadolinium. Une fois cette cage à gadolinium construite, le couplage est réalisé avec AFIM comme  
30 décrit ci-dessous.

AFIM-SH est en solution dans du tampon Tris (50 mM), NaCl (150 mM), pH = 7.4. 5 équivalents de TCEP sont pesés et dissous dans le même tampon et

additionnés à AFIM-SH. Le milieu est agité et laissé à T.A. durant 30 min.

La cage à gadolinium utilisée est celle décrite dans le document P. KANTHI, et al. ; « Synthesis of  
5 Charged and Uncharged Complexes of Gadolinium and Yttrium with Cyclic Polyazaphosphinic Acid Ligands for in vivo Applications », *J.CHEM SOC. PEKIN TRANS. 2*, 1993, pp.605-618.

5 équivalents de cage, par rapport à AFIM-SH,  
10 sont dissoutes dans du DMF, et ajoutées à AFIM-SH. Le tout est agité, et la réaction est poursuivie 30 min à T.A. Puis le milieu est dissous dans 150 ml de tampon Tris (50 mM), NaCl (150 mM), pH = 7.4, et ultra-filtré sur membrane YM3. L'échantillon est re-dilué et ultra-  
15 filtré plusieurs fois, en faisant le spectre UV du filtrat. Lorsqu'il n'y a plus de DMF dans le filtrat (pic à 214 nm), l'échantillon est concentré à quelques ml et conservé au frais à 4°C.

20 Le produit, une fois purifié est injecté par voie intraveineuse.

Les images sont recueillies au moyen d'une caméra de détection.

25 Exemple 9 : Marquage d'un peptide de la présente invention avec de l'or

Le marquage d'AFIM par l'or est un marquage direct. Il permet de détecter la phosphatidylsérine (PS) présente à la surface externe des cellules  
30 impliquées dans des processus physiopathologiques comme la mort cellulaire programmée (apoptose) la coagulation du sang, la réaction inflammatoire.

L'or est un métal dense aux électrons et permet

son usage en microscopie électronique. Ce couplage d'AFIM à l'or permet de détecter et de localiser la phosphatidylsérine à l'échelle de la cellule et des compartiments sub-cellulaires. Le produit couplé peut  
5 être utilisé *in vitro*.

---

AFIM-SH est mis en solution dans du tampon Tris (50 mM), NaCl (150 mM), pH = 7.4. 5 équivalents de tris-(2-carboxyéthyl)-phosphine (TCEP) en solution dans le même tampon sont additionnés à AHM-SH. Le milieu est  
10 agité durant 15 min.

Des billes d'or modifiées (contenant un maléimide greffé: Nanogold Monomaléimide Interchim (marque déposée)) sont dissoutes dans 20 µl de DMSO et 200 µl d'eau ; et additionnées à la solution précédente (2  
15 équivalents de billes par rapport à la protéine).

Le tout est agité, et la réaction est poursuivie une heure. Puis le milieu est purifié sur colonne de gel filtration (PD-10 Pharmacia (marque de commerce)) et élué avec du tampon PBS (Phosphate 20 mM, NaCl  
20 150 mM), pH = 7.4

AFIM-Au est utilisable sur des coupes de tissus ou sur des cellules isolées. L'analyse peut se faire par microscopie électronique.

## REVENDICATIONS

1. Peptide caractérisé en ce qu'il comprend la séquence peptidique (I) suivante :

5

J<sup>1</sup>-J<sup>2</sup>-J<sup>3</sup>-J<sup>4</sup>-J<sup>5</sup>-J<sup>6</sup>-Z<sup>7</sup>-U<sup>8</sup>-J<sup>9</sup>-J<sup>10</sup>-U<sup>11</sup>-Arg-J<sup>13</sup>-J<sup>14</sup>-U<sup>15</sup>-Lys-  
 Gly-X<sup>18</sup>-Gly-Thr-J<sup>21</sup>-Glu-J<sup>23</sup>-J<sup>24</sup>-U<sup>25</sup>-J<sup>26</sup>-J<sup>27</sup>-J<sup>28</sup>-U<sup>29</sup>-J<sup>30</sup>-J<sup>31</sup>-  
 Arg-J<sup>33</sup>-J<sup>34</sup>-J<sup>35</sup>-J<sup>36</sup>-B<sup>37</sup>-J<sup>38</sup>-J<sup>39</sup>-U<sup>40</sup>-J<sup>41</sup>-J<sup>42</sup>-J<sup>43</sup>-U<sup>44</sup>-J<sup>45</sup>-J<sup>46</sup>-J<sup>47</sup>-  
 J<sup>48</sup>-J<sup>49</sup>-Arg-J<sup>51</sup>-U<sup>52</sup>-J<sup>53</sup>-J<sup>54</sup>-Asp-U<sup>56</sup>-Lys-Ser-Z<sup>59</sup>-Leu-J<sup>61</sup>-J<sup>62</sup>-  
 10 J<sup>63</sup>-J<sup>64</sup>-Z<sup>65</sup>-J<sup>66</sup>-J<sup>67</sup>-U<sup>68</sup>-J<sup>69</sup>-J<sup>70</sup>-J<sup>71</sup>-U<sup>72</sup>-J<sup>73</sup>-J<sup>74</sup>-J<sup>75</sup> (I)

dans laquelle J, Z, U, X et B représentent des acides aminés tels que :

- les acides aminés J sont choisis indépendamment  
 15 les uns des autres parmi les acides aminés naturels, ou des dérivés de ceux-ci, de telle manière qu'au moins 50% d'entre eux sont des résidus polaires choisis parmi Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Lys, Orn, Pro, Ser, Thr et Tyr,

20 - les acides aminés U sont choisis parmi Ala, Cys, Gly, Ile, Leu, Met, Phe, Trp, Tyr et Val,

- l'acide aminé X<sup>18</sup> est choisi indépendamment des autres acides aminés de la séquence parmi Ala, Asn, Cys, Gln, Gly, His, Ile, Leu, Met, Phe, Ser, Thr, Trp,  
 25 Tyr et Val,

- l'acide aminé B<sup>37</sup> est choisi indépendamment des autres acides aminés de la séquence parmi Arg, Ala, Cys, Gly, Ile, Leu, Met, Phe, Trp, Tyr et Val,

- l'acide aminé Z<sup>7</sup> est choisi indépendamment des  
 30 autres acides aminés de la séquence parmi Asp et Glu,

- les acides aminés Z<sup>59</sup> et Z<sup>65</sup> sont choisis indépendamment parmi Glu, Asp, Lys ou Arg,

les exposants des J, Z, U, X et B représentant la position de ces acides aminés dans ladite séquence.

2. Peptide selon la revendication 1, dans lequel  
5 les acides aminés J sont choisis indépendamment les uns des autres parmi Ala, Arg, Asn, Asp, Cys, Gln, Glu, Gly, His, Ile, Leu, Lys, Met, Phe, Pro, Ser, Thr Trp, Tyr et Val de telle manière que au moins 50% d'entre eux sont des résidus polaires choisis parmi Arg, Asn,  
10 Asp, Gln, Glu, Gly, His, Lys, Pro, Ser et Thr.

3. Peptide selon la revendication 1, dans lequel les acides aminés U et B de la séquence (I) sont choisis suivant un des exemples a) à j) exposés dans le  
15 tableau 1 suivant :

	U <sup>8</sup>	U <sup>11</sup>	U <sup>15</sup>	U <sup>25</sup>	U <sup>29</sup>	B <sup>37</sup>	U <sup>40</sup>	U <sup>44</sup>	U <sup>52</sup>	U <sup>56</sup>	U <sup>68</sup>	U <sup>72</sup>
Ex a)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex b)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Leu
Ex c)	Ala	Ile	Ile	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Met	Val
Ex d)	Ala	Leu	Met	Leu	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex e)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Val	Tyr	Leu	Leu	Ile	Met
Ex f)	Ala	Leu	Met	Ile	Ile	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex g)	Ala	Leu	Met	Ile	Val	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Phe
Ex h)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met
Ex i)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Ile	Met

Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex = exemple)

4. Peptide comportant un séquence choisie parmi les séquences IDn°1 à IDn°10 de la liste de séquences annexée.

5. Peptide comportant la séquence IDn°1 de la liste de séquence annexée.

6. Peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant en outre, liée à l'extrémité N-terminale de la séquence (I), une séquence d'acides aminés choisie parmi Gly-Ser-Cys-, Gly-Ser-Thr-, Gly-Ser-Pro-, Gly-Ser-Ser-, Gly-Ser-Gly-, et Gly-Ser-Gln-.

7. Peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant en outre, liée à l'extrémité N-terminale de la séquence (I), une séquence d'acides aminés Gly-Ser-Gly-Cys-, Gly-Cys-Gly-Ser, Gly-Ser-Gly-Ser, Gly-Cys-Gly-Cys, Gly-Cys-Gly-Ser.

8. Peptide comportant la séquence IDn°11 ou IDn°12 de la liste de séquences annexée.

9. Peptide comportant la séquence IDn°13 ou IDn°14 de la liste de séquences annexée.

Ex j)	Ala	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Ala	Ala
Ex k)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Tyr	Leu	Leu	Val	Leu
Ex l)	Val	Leu	Met	Ile	Leu	Arg	Ile	Phe	Leu	Leu	Val	Leu

(Ex = exemple)

4. Peptide comportant une séquence choisie parmi les séquences IDn°1 à IDn°10 de la liste de séquences annexée.

5. Peptide comportant la séquence IDn°1 de la liste de séquence annexée.

10 6. Peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant en outre, liée à l'extrémité N-terminale de la séquence (I), une séquence d'acides aminés choisie parmi Gly-Ser-Cys-, Gly-Ser-Thr-, Gly-Ser-Pro-, Gly-Ser-Ser-, Gly-Ser-Gly-,  
15 et Gly-Ser-Gln-.

7. Peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, comprenant en outre, liée à l'extrémité N-terminale de la séquence (I), une  
20 séquence d'acides aminés Gly-Ser-Gly-Cys-, Gly-Cys-Gly-Ser, Gly-Ser-Gly-Ser, Gly-Cys-Gly-Cys, Gly-Cys-Gly-Ser.

8. Peptide comportant la séquence IDn°11 ou IDn°12 de la liste de séquences annexée.

25

9. Peptide comportant la séquence IDn°13 ou IDn°14 de la liste de séquences annexée.



10. Procédé de fabrication d'un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, ledit procédé comprenant une synthèse chimique en phase solide dudit peptide

5

11. Procédé de fabrication d'un peptide selon l'une des revendications 1 à 9, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

- 10 a) préparation d'un cDNA comprenant une séquence de base codant pour ledit peptide
- b) insertion dudit cDNA dans un vecteur d'expression approprié,
- b) transformation d'une cellule hôte appropriée, avec ledit vecteur dans lequel le cDNA a été
- 15 inséré, pour une répllication du plasmide,
- c) fabrication dudit peptide par traduction dudit cDNA dans ladite cellule hôte, et
- d) récupération du peptide synthétisé.

20 12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel le vecteur est un plasmide.

13. Procédé selon la revendication 11, dans lequel le vecteur est le vecteur pGEX-2T.

25

14. Procédé selon la revendication 11, 12 ou 13, dans lequel la cellule hôte est *E. Coli*.

15. Assemblage chimique ayant une affinité pour

30 un phospholipide, caractérisé en ce qu'il comprend au moins deux peptides tels que définis dans les revendications 1 à 9, identiques ou différentes, lesdits peptides étant liés entre eux.

10. Procédé de fabrication d'un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, ledit procédé comprenant une synthèse chimique en phase solide dudit peptide

5

---

11. Procédé de fabrication en culture d'un peptide selon l'une des revendications 1 à 9, ledit procédé comprenant les étapes suivantes :

- 10 a) préparation d'un cDNA comprenant une séquence de base codant pour ledit peptide  
b) insertion dudit cDNA dans un vecteur d'expression approprié,  
c) transformation d'une cellule hôte appropriée, avec ledit vecteur dans lequel le cDNA a été  
15 inséré, pour une répllication du plasmide,  
d) fabrication dudit peptide par traduction dudit cDNA dans ladite cellule hôte, et  
e) récupération du peptide synthétisé.

20 12. Procédé selon la revendication 11, dans lequel le vecteur est un plasmide.

25 13. Procédé selon la revendication 11, dans lequel le vecteur est le vecteur pGEX-2T.

14. Procédé selon la revendication 11, 12 ou 13, dans lequel la cellule hôte est *E. Coli*.

30 15. Assemblage chimique ayant une affinité pour un phospholipide, caractérisé en ce qu'il comprend au moins deux peptides tels que définis dans les revendications 1 à 9, identiques ou différentes, lesdits peptides étant liés entre eux.

16. Assemblage chimique selon la revendication 15, dans lequel au moins un des peptides est un des peptides définis dans la revendication 4.

5

17. Utilisation d'un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 pour le recouvrement d'un biomatériau.

10

18. Utilisation d'un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9 dans la fabrication d'un filtre pour le piégeage de cellules sanguines circulantes activées.

15

19. Composé de marquage comprenant un peptide tel que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 9 couplé à une molécule de marquage ou à des nanoparticules denses en microscopie électronique.

20

20. Composé de marquage caractérisé en ce qu'il comprend un assemblage tel que défini dans la revendication 15 ou 16 couplé à une molécule de marquage ou à des nanoparticules denses en microscopie électronique.

25

21. Composé selon la revendication 19 ou 20 dans lequel la molécule de marquage est une molécule fluorescente.

30

22. Composé selon la revendication 19 ou 20 dans lequel la molécule de marquage est constituée d'un des partenaires du système avidine-biotine.

23. Composé selon la revendication 19 ou 20 dans lequel la molécule de marquage est un radioélément.

24. Composé selon la revendication 19 ou 20 dans lequel la molécule de marquage est un agent de contraste en imagerie à résonance magnétique.

25. Composé selon la revendication 19 ou 20 dans lequel la molécule de marquage est du technétium.

10

26. Composé selon la revendication 19 ou 20 dans lequel les nanoparticules denses en microscopie électronique sont des nanoparticules d'or.

27. Trousse de diagnostic comprenant un composé selon l'une quelconque des revendications 19 à 20.

28. Trousse de diagnostic selon la revendication 27, comprenant en outre un réactif adéquat permettant de détecter ladite molécule de marquage.

29. Trousse d'analyse et de détection de charges négatives à la surface de cellules, caractérisée en ce qu'elle comprend un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.

30. Trousse d'analyse et de détection de charges négatives à la surface de cellules, caractérisée en ce qu'elle comprend un assemblage selon la revendication 15 ou 16.

31. Trousse d'analyse et de détection de microvésicules dans le sang, caractérisée en ce qu'elle

comprend un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.

5 32. Trousse d'analyse et de détection de microvésicules dans le sang, caractérisée en ce qu'elle comprend un assemblage selon la revendication 15 ou 16.

10 33. Trousse selon la revendication 29 ou 29, dans laquelle le peptide est couplé à un marqueur.

34. Trousse selon la revendication 30 ou 32, dans laquelle l'assemblage est couplé à un marqueur.

15 35. Filtre de dialyse de cellules sanguines circulantes activées, ledit filtre étant caractérisé en ce qu'il comprend un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.

comprend un peptide selon l'une quelconque des revendications 1 à 9.

32. Trousse d'analyse et de détection de  
5 microvésicules dans le sang, caractérisée en ce qu'elle  
comprend un assemblage selon la revendication 15 ou 16.


---

33. Trousse selon la revendication 29 ou 31, dans  
laquelle le peptide est couplé à un marqueur.


10

34. Trousse selon la revendication 30 ou 32, dans  
laquelle l'assemblage est couplé à un marqueur.


35. Filtre de dialyse de cellules sanguines  
15 circulantes activées, ledit filtre étant caractérisé en  
ce qu'il comprend un peptide selon l'une quelconque des  
revendications 1 à 9.



AFIM-F



AS-F



H1








Fig. 1



AFIM-F



H  
2



A5-F

Fig. 2






FIG. 3

LISTE DE SEQUENCES

<110> COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE  
UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS VI)

<120> PEPTIDES AYANT UNE AFFINITE POUR UN PHOSPHOLIPIDE ET  
UTILISATIONS

<130> B14001.3EE

<140>

<141>

<160> 14

<170> PatentIn Ver. 2.1

<210> 1

<211> 75

<212> PRT

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<400> 1

Gly Phe Asp Glu Arg Ala Asp Val Glu Thr Leu Arg Lys Ala Met Lys  
1 5 10 15

Gly Leu Gly Thr Asp Glu Glu Ser Ile Leu Thr Leu Leu Thr Ser Arg  
20 25 30

Ser Asn Ala Gln Arg Gln Glu Ile Ser Ala Ala Tyr Lys Thr Leu Phe  
35 40 45

Gly Arg Asp Leu Leu Asp Asp Leu Lys Ser Glu Leu Thr Gly Lys Phe  
50 55 60

Glu Lys Leu Val Val Ala Leu Leu Lys Pro Ser  
65 70 75

<210> 2

<211> 75

<212> PRT

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<400> 2

Asn Phe Asp Ala Glu Arg Asp Ala Leu Asn Ile Arg Lys Ala Ile Lys  
1 5 10 15

Gly Met Gly Val Asp Glu Asp Thr Ile Val Asn Ile Leu Thr Asn Arg  
20 25 30

Ser Asn Ala Gln Arg Gln Asp Ile Ala Phe Ala Tyr Gln Arg Arg Thr  
35 40 45

Lys Arg Glu Leu Ala Ser Asp Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly His Leu  
50 55 60

Glu Arg Val Ile Leu Gly Leu Leu Lys Thr Ser  
65 70 75

<210> 3

<211> 75

<212> PRT

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<400> 3

Asp Phe Ser Pro Ser Val Asp Ala Glu Ala Ile Arg Lys Ala Ile Lys  
1 5 10 15

Gly Ile Gly Thr Asp Glu Asp Met Leu Ile Ser Ile Leu Thr Glu Arg  
20 25 30

Ser Asn Ala Gln Arg Gln Leu Ile Val Lys Glu Tyr Gln Ala Ala Tyr  
35 40 45

Gly Arg Glu Leu Lys Asp Asp Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly His Phe  
50 55 60

Glu Arg Leu Met Val Ala Leu Val Thr Pro Ser  
65 70 75

<210> 4

<211> 75

<212> PRT

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<400> 4

Gly Phe Asn Ala Met Glu Asp Ala Gln Thr Leu Arg Lys Ala Met Lys  
1 5 10 15

Gly Leu Gly Thr Asp Glu Asp Ala Ile Ile Ser Val Leu Ala Tyr Arg  
20 25 30

Asn Thr Ala Gln Arg Gln Glu Ile Arg Thr Ala Tyr Lys Ser Thr Ile  
35 40 45

Gly Arg Asp Leu Ile Asp Asp Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly Asn Phe  
50 55 60

Glu Arg Val Ile Val Gly Met Met Thr Pro Ser  
65 70 75

<210> 5

<211> 75  
 <212> PRT  
 <213> Séquence artificielle

<220>  
 <223> Description de la séquence artificielle: séquence  
 dérivée d'une annexine humaine

<400> 5  
 Gly Phe Asp Pro Asn Gln Asp Ala Glu Ala Leu Arg Thr Ala Met Lys  
 1 5 10 15

Gly Phe Gly Ser Asp Glu Glu Ala Ile Leu Asp Ile Ile Thr Ser Arg  
 20 25 30

Ser Asn Arg Gln Arg Gln Glu Val Cys Gln Ser Tyr Lys Ser Leu Tyr  
 35 40 45

Gly Arg Asp Leu Ile Ala Asp Leu Lys Ser Glu Leu Thr Gly Lys Phe  
 50 55 60

Glu Arg Leu Ile Val Gly Leu Met Arg Pro Ser  
 65 70 75

<210> 6  
 <211> 75  
 <212> PRT  
 <213> Séquence artificielle

<220>  
 <223> Description de la séquence artificielle: séquence  
 dérivée d'une annexine humaine

<400> 6  
 Gly Phe Asn Pro Asp Ala Asp Ala Lys Ala Leu Arg Lys Ala Met Lys  
 1 5 10 15

Gly Leu Gly Thr Asp Glu Asp Thr Ile Ile Asp Ile Ile Thr His Arg  
 20 25 30

Ser Asn Val Gln Arg Gln Gln Ile Arg Gln Thr Phe Lys Ser His Phe  
 35 40 45

Gly Arg Asp Leu Met Thr Asp Leu Lys Ser Glu Ile Ser Gly Asp Leu  
 50 55 60

Glu Arg Leu Ile Leu Gly Leu Met Met Pro Ser  
 65 70 75

<210> 7  
 <211> 75  
 <212> PRT  
 <213> Séquence artificielle

<220>  
 <223> Description de la séquence artificielle: séquence  
 dérivée d'une annexine humaine

<400> 7

Pro Gly Asp Ala Ile Arg Asp Ala Glu Ile Leu Arg Lys Ala Met Lys  
 1 5 10 15  
 Gly Phe Gly Thr Asp Glu Gln Ala Ile Val Asp Val Val Ala Asn Arg  
 20 25 30  
 Ser Asn Asp Gln Arg Gln Lys Ile Lys Ala Ala Phe Lys Thr Ser Tyr  
 35 40 45  
 Gly Arg Asp Leu Ile Lys Asp Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly Asn Met  
 50 55 60  
 Glu Arg Leu Ile Leu Ala Leu Phe Met Pro Ser  
 65 70 75

<210> 8  
 <211> 75  
 <212> PRT  
 <213> Séquence artificielle

<220>  
 <223> Description de la séquence artificielle: séquence  
 dérivée d'une annexine humaine

<400> 8  
 His Phe Asn Pro Asp Pro Asp Val Glu Thr Leu Arg Lys Ala Met Lys  
 1 5 10 15  
 Gly Ile Gly Thr Asn Glu Gln Ala Ile Ile Asp Val Leu Thr Lys Arg  
 20 25 30  
 Ser Asn Thr Gln Arg Gln Thr Ile Ala Lys Ser Phe Lys Ala Gln Phe  
 35 40 45  
 Gly Arg Asp Leu Thr Glu Asp Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly Lys Leu  
 50 55 60  
 Glu Arg Leu Ile Val Ala Leu Met Tyr Pro Ser  
 65 70 75

<210> 9  
 <211> 75  
 <212> PRT  
 <213> Séquence artificielle

<220>  
 <223> Description de la séquence artificielle: séquence  
 dérivée d'une annexine humaine

<400> 9  
 Gly Phe Asp Pro Leu Arg Asp Ala Glu Val Leu Arg Lys Ala Met Lys  
 1 5 10 15  
 Gly Phe Gly Thr Asp Glu Gln Ala Ile Ile Asp Cys Leu Gly Ser Arg  
 20 25 30  
 Ser Asn Lys Gln Arg Gln Gln Ile Leu Leu Ser Phe Lys Thr Ala Tyr  
 35 40 45

Gly Arg Asp Leu Ile Lys Asp Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly Asn Phe  
50 55 60

Glu Lys Thr Ile Leu Ala Leu Met Lys Thr Ser  
65 70 75

<210> 10  
<211> 75  
<212> PRT  
<213> Séquence artificielle

---

<220>  
<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<400> 10  
Gly Phe Asp Val Asp Arg Asp Ala Lys Lys Leu Arg Lys Ala Met Lys  
1 5 10 15

Gly Met Gly Thr Asn Glu Ala Ala Ile Ile Glu Ile Leu Ser Gly Arg  
20 25 30

Thr Ser Asp Glu Arg Gln Gln Ile Lys Gln Lys Tyr Lys Ala Thr Tyr  
35 40 45

Gly Arg Glu Leu Glu Glu Asp Leu Lys Ser Glu Leu Ser Gly Asn Phe  
50 55 60

Glu Lys Thr Ala Leu Ala Leu Leu Asp Arg Ser  
65 70 75

<210> 11  
<211> 79  
<212> PRT  
<213> Séquence artificielle

<220>  
<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<220>  
<223> Xaa en position 22 est Leu, Met ou Trp

<220>  
<223> Xaa en position 34 est Thr ou Lys

<220>  
<223> Xaa en position 45 est Ser ou Lys

<220>  
<223> Xaa en position 48 est Phe ou Tyr

<220>  
<223> Xaa en position 50 est Thr ou Glu

<220>  
<223> Xaa en position 63 est Glu ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 69 est Glu ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 71 est Glu ou Leu

<400> 11

Gly Ser Gly Cys Gly Phe Asp Glu Arg Ala Asp Val Glu Thr Leu Arg  
1 5 10 15

Lys Ala Met Lys Gly Xaa Gly Thr Asp Glu Glu Ser Ile Leu Thr Leu  
20 25 30

Leu Xaa Ser Arg Ser Asn Ala Gln Arg Gln Glu Ile Xaa Ala Ala Xaa  
35 40 45

Lys Xaa Leu Phe Gly Arg Asp Leu Leu Asp Asp Leu Lys Ser Xaa Leu  
50 55 60

Thr Gly Lys Phe Xaa Lys Xaa Val Val Ala Leu Leu Lys Pro Ser  
65 70 75

<210> 12

<211> 78

<212> PRT

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<400> 12

Gly Ser Pro Gly Phe Asp Glu Arg Ala Asp Val Glu Thr Leu Arg Lys  
1 5 10 15

Ala Met Lys Gly Leu Gly Thr Asp Glu Glu Ser Ile Leu Thr Leu Leu  
20 25 30

Thr Ser Arg Ser Asn Ala Gln Arg Gln Glu Ile Ser Ala Ala Tyr Lys  
35 40 45

Thr Leu Phe Gly Arg Asp Leu Leu Asp Asp Leu Lys Ser Glu Leu Thr  
50 55 60

Gly Lys Phe Glu Lys Leu Val Val Ala Leu Leu Lys Pro Ser  
65 70 75

<210> 13

<211> 83

<212> PRT

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<220>

<223> Xaa en position 25 est Leu, Met ou Trp

<220>

<223> Xaa en position 37 est Thr ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 48 est Ser ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 51 est Phe ou Tyr

<220>

<223> Xaa en position 53 est Thr ou Glu

---

<220>

<223> Xaa en position 66 est Glu ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 72 est Glu ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 74 est Glu ou Leu

<400> 13

Gly	Ser	Glu	Cys	Asp	Phe	Pro	Gly	Phe	Asp	Glu	Arg	Ala	Asp	Val	Glu
1				5					10					15	

Thr	Leu	Arg	Lys	Ala	Met	Lys	Gly	Xaa	Gly	Thr	Asp	Glu	Glu	Ser	Ile
			20					25					30		

Leu	Thr	Leu	Leu	Xaa	Ser	Arg	Ser	Asn	Ala	Gln	Arg	Gln	Glu	Ile	Xaa
		35					40					45			

Ala	Ala	Xaa	Lys	Xaa	Leu	Phe	Gly	Arg	Asp	Leu	Leu	Asp	Asp	Leu	Lys
	50					55					60				

Ser	Xaa	Leu	Thr	Gly	Lys	Phe	Xaa	Lys	Xaa	Val	Val	Ala	Leu	Leu	Lys
65					70					75				80	

Pro Ser Arg

<210> 14

<211> 87

<212> PRT

<213> Séquence artificielle

<220>

<223> Description de la séquence artificielle: séquence  
dérivée d'une annexine humaine

<220>

<223> Xaa en position 29 est Leu, Met ou Trp

<220>

<223> Xaa en position 41 est Tyr ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 52 est Ser ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 55 est Phe ou Tyr



<220>

<223> Xaa en position 57 est Thr ou Glu

<220>

<223> Xaa en position 70 est Glu ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 76 est Glu ou Lys

<220>

<223> Xaa en position 78 est Glu ou Leu

<400> 14

Gly	Ser	Gly	Cys	Gly	Thr	Glu	Thr	Asp	Phe	Pro	Gly	Phe	Asp	Glu	Arg
1				5					10					15	

Ala	Asp	Val	Glu	Thr	Leu	Arg	Lys	Ala	Met	Lys	Gly	Xaa	Gly	Thr	Asp
			20					25					30		

Glu	Glu	Ser	Ile	Leu	Thr	Leu	Leu	Xaa	Ser	Arg	Ser	Asn	Ala	Gln	Arg
		35					40					45			

Gln	Glu	Ile	Xaa	Ala	Ala	Xaa	Lys	Xaa	Leu	Phe	Gly	Arg	Asp	Leu	Leu
		50				55					60				

Asp	Asp	Leu	Lys	Ser	Xaa	Leu	Thr	Gly	Lys	Phe	Xaa	Lys	Xaa	Val	Val
65					70					75					80

Ala	Leu	Leu	Lys	Pro	Ser	Arg
				85		



**BREVET D'INVENTION**  
**CERTIFICAT D'UTILITÉ**  
 Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**cerfa**  
 N° 11 235\*02

**DÉPARTEMENT DES BREVETS**

26 bis, rue de Saint Pétersbourg  
 75800 Paris Cedex 08  
 Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

**DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1. / 1.  
 (Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260299

<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif)		B 14001.3/EE BD1404/UNIVERSITE	
<b>N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL</b>		02.08202 du 01.07.2002	
<b>TITRE DE L'INVENTION</b> (200 caractères ou espaces maximum) PEPTIDES AYANT UNE AFFINITE POUR UN PHOSPHOLIPIDE ET UTILISATIONS.			
<b>LE(S) DEMANDEUR(S) :</b> COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31/33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème Université Pierre et Marie CURIE ( Paris VI) 4 Place Jussieu Tour Centrale 75252 PARIS CEDEX 05			
<b>DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :</b> (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
<b>Nom</b>		SANSON	
<b>Prénoms</b>		Alain	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	2 avenue de la Villeneuve	
	<b>Code postal et ville</b>	91940	GOMETZ LE CHATEL
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>Nom</b>		OCHSENBEIN	
<b>Prénoms</b>		Françoise	
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>	12 rue des Patriarches	
	<b>Code postal et ville</b>	75005	PARIS
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>Nom</b>			
<b>Prénoms</b>			
<b>Adresse</b>	<b>Rue</b>		
	<b>Code postal et ville</b>		
<b>Société d'appartenance</b> (facultatif)			
<b>DATE ET SIGNATURE(S)</b> <b>DU (DES) DEMANDEUR(S)</b> <b>OU DU MANDATAIRE</b> (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 23 Juillet 2002 P. AUDIER 422-5/002			

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**